

تعليمات وإرشادات لعمليات الشفة الأرنبية Cleft Lip



هذا المنشور من إعداد طبيبك د. ناصر العسكري - استشاري جراحة الفم والوجه والفكين

« معلومات عامة »



تختلف الطرق الجراحية المستخدمة باختلاف نوع الشفة الأرنبية -أحادية أو ثنائية- ومدى وسعها أو امتدادها وخبرة وطريقة الجراح



مدة العملية :

تستغرق العملية من ساعة إلى ساعتين ويسبق ذلك بعض الوقت لإجراءات التخدير ومن ثم فترة الإفاقة



يُمكن أن تكون الشفة المشقوقة على جانب واحد أو كلا جانبي الشفة أو في المنتصف ، والأطفال المُصابون من الشفة المشقوقة قد يكون لديهم الحنك المشقوق أيضاً

إجراء جراحي تجميلي ووظيفي
لإغلاق فتحة الشفة العلوية
ومنطقة الأنف واللثة



Before

After



الشفة الارنبية أو المشقوقة هي أحد العيوب الخلقية التي تحدث عندما لا تتشكل شفاه الطفل أو فمه بشكل صحيح أثناء الحمل، وتسمى هذه العيوب الخلقية بالشفوق الفموية



تُجرى العملية بعد عمر ٣ إلى ٤ أشهر وهي الفترة التي يكون فيها وزن وصحة الطفل في حالة أفضل لتحمل التخدير والتدخل الجراحي



تأخير وقت العملية عن أربع أشهر أو أكثر لظروف معينة لن يؤثر على النتائج النهائية وظيفياً وجمالياً

الإصابة بالشفة الأرنبية لا يجب أن تكون عائقاً وحاجزاً نفسياً في حياة الطفل وأهله ، ويمكن له أن يُمارس حياته بشكل طبيعي ويدرس ويعمل ويتزوج كأى فرد من أفراد المجتمع

رسالتي
لكم

« تعليمات ما قبل العملية »

* سيقوم الطبيب المعالج بشرح مفصل عن طريقة العملية والنتائج المتوقعة
* من المهم الإفصاح عن التاريخ المرضي للطفل وإبلاغ الطبيب إن كان لدى الطفل أمراض مزمنة والأدوية المستخدمة ، أو أي حساسية من دواء أو غيره ، وإذا كان لديكم أي تقارير طبية تخص حالته يمكنكم إحضارها معكم لموعد الفحص



في حالات التوسع الشديد في فتحة الشفة الأرنبية يُنصح باستخدام اللاصق القوي بين طرفي الشفة إلى حين موعد العملية



سيتم إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية ومعاينة الطفل من قبل طبيب التخدير



يلزم التوقف عن إرضاع الطفل قبل أربع ساعات من العملية ، ومن المُحتمل وضع محلول وريدي (مغذي) في حال تأخر وقت العملية



ملاحظة : هذا المنشور يحتوي على صفحتين



Dr. Nasser Allasseri

OMFS SURGEON



@NasserAllasseri



@NasserAllasseri



@Nasser.Allasseri



@N.Allasseri

« تعليمات ما بعد العملية »

بعد الإفاقة والتأكد من استقرار حالة الطفل
والبدء في تغذيته يُمكن الخروج من المستشفى



ملاحظة : تكون الأنسجة المحيطة بإصلاح الشفة
الأرنبية ضعيفة خلال الأسبوعين الأولى من العملية
لذلك من الضروري اتباع الارشادات لتجنب إصابتها
ولتسريع عملية الالتئام و ضمان راحة الطفل



تغذية الطفل خلال الأسبوع الأول بعد
العملية تتم عن طريق بربوز أو رضاعة خاصة
بالشفة الأرنبية وسيقوم الطبيب المعالج
بتحديد الأفضل لطفلك



نظراً لوجود المحلول الوريدي
(المغذي)، لايلزم إرضاع الطفل
مباشرة بعد العملية حتى تسمح
المرمضة المسؤولة بذلك



قد يواجه الطفل صعوبة في التغذية في
البداية نظراً لأثر العملية ولكّنه سرعان
مايستجيب ويرضع بشكل طبيعي



يُنصح بتغطية يد الطفل أو تثبيتها (إن لزم)
خلال الأسبوع الأول بعد العملية



يجب إبقاء الطفل على ظهره خلال الأسبوع
الأول لتجنب تعرض الشفة لأي احتكاك



خروج سوائل أو نقط دم من فتحات الأنف
يُعتبر أمر طبيعي في الأيام الأولى من العملية



يُفضل عدم إزالة تخرثر الدم من منطقة الشفة
و تركها لتسقط تلقائياً



يُمكن تنظيف منطقة الأنف بشكل يومي
باستخدام أعواد تنظيف الأذن بعد تبليها بالماء



لامانع من استحمام الطفل بعد العملية
مباشرة مع الحرص على تجنب وصول الماء
لمنطقة الشفة العلوية



سيقوم الطبيب بوضع لصقات على
الشفة العلوية لتغطية الجرح خلال
الأسبوع الأول من العملية



تجنّب إزالة اللصقات وسيقوم الطبيب
بإزالتها لاحقاً والاطمئنان على العملية



يُمكن إضافة اللصقات فوق الجرح
مباشرة - في حال سقوطها- دون الحاجة
إلى الذهاب إلى المستشفى



قد يعاني الطفل من اضطراب وشخير
في النوم في الأيام الأولى بعد العملية
وسرعان ما سيعود لوضعه الطبيعي



يُفضل أن يكون نوم الطفل على ظهره
في الأسابيع الأولى لتجنب الضغط على
منطقة الشفة



قد يشعر الطفل بألم بسيط خلال الأيام الأولى بعد العملية ويحتاج حينها لمسكن الألم العادي

لا تحتاج مثل هذه العمليات لوصف مضاد حيوي و لا يُنصح بأخذه إلا عند وصف الطبيب

سيتم وصف مرهم أو جل مرطب (سيليكون) يتم استخدامه بعد شهر من العملية كمساج للندبة
ويستخدم ثلاث مرات يومياً ولمدة تسعة أشهر

الأدوية

لايلزم إزالة الخيوط الجراحية لأنها ستتحلل ذاتياً خلال أسابيع
قليلة

في حالات تجميل الشفة الأرنبية للكبار يتم استخدام خيوط جراحية
من نوع آخر ويلزم إزالتها بعد ستة أو سبعة أيام من العملية

سيكون هناك احمرار وانتفاخ وصلابة في منطقة الندبة خلال
فترة الالتئام الأولى والتي قد تستغرق عدة أشهر ثم تتحسن
تدريجياً إلى أن تظهر النتيجة النهائية المرضية لكم بإذن الله

الخروج من المستشفى والمتابعة

عمليات الشفة الأرنبية لا تتطلب المكوث في
المستشفى ، ولذلك سيكون الخروج في نفس
يوم العملية في معظم الحالات



موعد المتابعة بعد خمس أيام من إجراء العملية
وسيتم خلاله إزالة الضماد وتنظيف الجرح ووضع
لصقات جديدة لمدة خمس أيام أخرى



في حال تواجدكم خارج الرياض أو المملكة سيكون هناك مرونة في تحديد أيام
المتابعة ويمكن أيضاً تغيير الضماد للطفل في المدينة التي يسكن فيها
ومن ثم الحضور لموعد المتابعة لاحقاً



Dr. Nasser Alasserri

مع تمنياتي لكم بالشفاء العاجل ..



OMFS SURGEON



@NasserAlasserri



@NasserAlasserri



@Nasser.Alasseri



@N.Alasseri